




Ajuntament d'Argentona

## Virus del Papil·loma Humà (VPH)



Hi ha més de 40 tipus de virus del papil·loma humà genital o VPH que poden afectar tant a homes com a dones. En el 90% de los casos, el sistema immunitari elimina de forma natural la infecció. El VPH causa berrugues genitals i en nombroses ocasions càncer del coll d'úter. De forma menys freqüent pot provocar càncer de vagina, penis i anus. Aquest virus es transmet per contacte genital y pot aparèixer anys després d'haver tingut contacte sexual amb una persona infectada. La vacuna contra el VPH se ha generalitzat en Espanya en los últims anys per menors de 14 anys.

La **prevenció primària** els programes de prevenció i la vacunació son las vies més eficaces per reduir la incidència del càncer de cèrvix o de coll de úter, aquest tipus de tumor ginecològic afecta en Espanya a més de 2.100 dones/any i és responsable de la mort d'aproximadament unes 730 dones/any. Tant en Europa como en Espanya és el segon càncer més freqüent entre les dones menors de 45 anys. Por un altre costat, Luis Puig-Tintoré, de l'Associació Espanyola de Patologia Cervical del hospital Clínic de Barcelona, comenta que "la realització de proves per a la detecció del virus ha incentivat un major coneixement del paper del virus del papil·loma humà (VPH) en el càncer de cèrvix".



Les recomanacions actuals suggereixen la realització de proves de detecció del virus VPH en dones de 35 anys i un exàmen citològic cada 5 anys. "Es molt important que les dones siguin conscients de la rellevància d'aquest criatge , perquè si es detecten lesions precanceroses, sí es pot tractar, en canvi, els resultats no son tan bons si ja hi ha un tumor de cèrvix@

En quant a la **vacunació contra el VPH**, l'experiència en programes de vacunació amb les dues vacunes disponibles, ha demostrat que ambdues tenen un bon nivell d'eficàcia.